

Vardenafil 20mg

Warum sollte man Vardenafil gegenüber anderen Medikamenten fuer Erektile Dysfunktion waehlen?

Vardenafil wird von Maennern gekauft die an einer erektilen Dysfunktion oder in anderen Worten an Impotenz leiden, aber auch gesundheitliche Probleme haben, wie etwa Diabetes, hohes Cholesterin oder Bluthochdruck. Vardenafil ist ein Arzneistoff aus der Gruppe der PDE-5-Hemmer, welche eine gefaesserweiternde Substanz enthaelt, und wird fuer die Behandlung der erektilen Dysfunktion benutzt, dass heisst bei Erektionsstoerungen. Eine erektile Dysfunktion ist eine Sexualstoerung, bei der es einem Mann ueber einen laengeren Zeitraum hinweg unmoeglich ist eine Erektion zu haben oder eine ausreichende Erektion zu erzielen oder beizubehalten. Erektile Dysfunktionen machen ein zufriedenes Sexualleben unmoeglich und Vardenafil kann dem entgegenwirken.

Erektionsstoerungen treten meistens in der zweiten Lebenshaelfte eines Mannes auf. Jedoch auch schon Maenner von 40 Jahren kaufen Vardenafil, besonders wenn Sie Probleme mit Diabetes oder Cholesterin haben. Leider nehmen sich die Maenner nicht die Zeit sich richtig zu informieren welches Medikament am Besten zu Ihnen passt und kaufen alle Arten von Potenzmittel natuerlicher Art oder kaufen irgend ein chemisches Produkt dass nicht geprueft wurde und die Dunkelziffer ist gross. Informieren Sie sich bei uns bevor Sie ein Potenzmittel kaufen.

Vardenafil wird oral 30-60 Minuten vor dem Verkehr eingenommen, die meisten Maenner berichten, dass Sie eine Wirkung schon nach 30 Minuten spueren, sodass Sex spontaner stttfinden kann. Bei anderen Potenzmittel dauert es meistens laenger bis die Wirkung da ist. Wichtig ist dass Vardenafil sowie ander Potenzmittel fuer erektile Dysfunktion nur helfen bei gleichzeitiger sexueller Stimulation. Vardenafil allein hat keine Lust steigernde Wirkung! Vardenafil wird in drei Dosierungen angeboten: 5, 10 und 20 mg. Es sind nur wenige Nebenwirkungen bekannt. Kaufen Sie Vardenafil bei uns online.

Vardenafil ist dass Potenzmittel fuer erektile Dysfunktion dass es schon sehr lange auf dem Markt zu kaufen gibt und gehoert zu den fuehrenden Potenzmittel fuer erektile Dysfunktion und wurde lange erforscht und getestet. Sie werden vom Kauf nicht entauscht sein, im Gegenteil.

Kaufen Sie Vardenafil bei uns in der Online Apotheke. Der Kauf ist diskret und praktisch und ohne jegliche Versandkosten. Sie werden sehen dass auch Sie ein zufriedenes Sexualleben erleben koennen. Kaufen Sie Vardenafil, Sie werden es nicht bereuen

Wie wirkt der Inhaltsstoff?

Vardenafil wird zur Behandlung von Impotenz (erektile Dysfunktion) eingesetzt.

Die Ursachen von Impotenz sind vielfaeltig. Bei Maennern ab 50 Jahren sind es meistens andere Erkrankungen, wie Arteriosklerose oder Bluthochdruck. Dann ist die Impotenz ein wichtiges Fruehwarzeichen fuer diese Erkrankungen. Sie sollten auf jeden Fall behandelt werden. In etwa 20 Prozent der Faelle ist die Impotenz psychisch bedingt, besonders in der Altersgruppe bis 35 Jahre.

Die Erektion des Penis beruht auf einem raschen Bluteinstrom in den Schwellkoerper. Dazu muessen sich die Arterien erweitern. Dies ist nur moeglich, wenn die umliegende Muskulatur erschlafft.

Bei sexueller Stimulation wird daher der Botenstoff Stickstoffmonoxid (NO) freigesetzt. Er aktiviert einen zweiten Botenstoff, das cGMP. Erst das cGMP laesst die Muskelzellen im Schwellkoerper erschlaffen und ermoeglicht damit den Bluteinstrom und die Erektion. Um die Erektion zu beenden wird cGMP ueber das Enzym Phosphodiesterase 5 (PDE-5) wieder abgebaut.

Vardenafil ist ein PDE-5-Hemmer. Es blockiert das Enzym Phosphodiesterase 5. Dadurch bleibt mehr cGMP im Umlauf, die Muskelentspannung verstärkt sich und die Erektion wird verbessert.

Auf Grund dieses Mechanismus wirkt Vardenafil nur bei sexuell erregten Männern. Es hat keine luststeigernde Wirkung und kann deshalb keine Erektion erzwingen.

Die Wirkung von Vardenafil tritt schnell ein und hält bis zu 5 Stunden an. Damit ermöglicht Vardenafil auch spontanen Geschlechtsverkehr. Männer nehmen eine Tablette am besten 25 bis 60 Minuten vorher ein.

Anwendungsgebiete

Impotenz

Warnhinweise!

Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch die Sehleistung und somit das Reaktionsvermögen im Straßenverkehr oder bei der Bedienung von Maschinen beeinflussen.

Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol.

Wann ist das Medikament nicht für Sie geeignet (Kontraindikation)?

Erblich bedingte Erkrankungen der Netzhaut (Retina) des Auges, bei der die Funktion und die Strukturen der Zellen zu Grunde gehen

Gleichzeitige Behandlung mit weiteren potenzfördernden Medikamenten

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren

Niedriger Blutdruck (Hypotonie)

Patienten, die zu Dauererektionen (Priapismus) neigen oder deren Penis anatomisch deformiert ist sollten das Medikament nur mit Vorsicht anwenden. Eine Dauererektion muss sofort ärztlich behandelt werden, sonst können Gewebsschäden und Potenzverlust die Folge sein.

Vorsicht bei schweren Leber-, Nieren- und Herzerkrankungen

Schwangerschaft und Stillzeit

Für Frauen nicht indiziert

Nebenwirkungen

Aufgelistet sind die wichtigsten, bekanntesten Nebenwirkungen. Sie können auftreten, müssen aber nicht, da jeder Mensch unterschiedlich auf Medikamente anspricht. Manchmal reagieren Menschen allergisch auf Medikamente. Sollten Sie Anzeichen einer allergischen Reaktion verspüren, informieren Sie sofort Ihren Arzt oder Apotheker.
Kopfschmerzen

Schwindel

Überreizbarkeit des Magens. Sie ist gekennzeichnet durch Völlegefühl, Magendruck und vorzeitigem Sättigungsgefühl, Sodbrennen, Oberbauchschmerzen, Übelkeit und selten auch Erbrechen.

Verstopfung der Nase

Hautrötung mit Hitzegefühl (Flush)

Sehstörungen (Gelegentlich)

Überempfindlichkeit der Haut gegen Sonnenlicht (Photosensibilität) (Gelegentlich)

Bluthochdruck (Gelegentlich)

Wechselwirkungen

Die Wirkung von Medikamenten gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Nitrate oder NO-Donatoren beinhalten, kann stark ansteigen. Eine gleichzeitige Einnahme kann zu starkem Blutdruckabfall mit Kollaps führen. Daher dürfen Patienten mit diesen Herz-Kreislauf-Medikamenten Vardenafil nicht anwenden.

Bestimmte Medikamente gegen Infektionen mit Bakterien, Viren oder Pilzen, sowie die Einnahme mit Grapefruitsaft können die Nebenwirkungen von Vardenafil erhöhen und sollte deshalb möglichst vermieden werden.

Die gleichzeitige Anwendung von Alpha-Blockern gegen Bluthochdruck oder eine gutartige Prostatavergrößerung kann den Blutdruck zu stark senken und sollte deshalb unterbleiben. Dieser Text erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es werden nur klinisch bedeutende Informationen aufgeführt. Die Beschreibung ist neutral und basiert auf der vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) anerkannten FACHINFORMATION. Die Informationen stellen keine Empfehlung oder Bewerbung des Präparates dar. Sie ersetzen auch nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker.

* Die Illustrationen dienen nur grafischen Zwecken.