

ED Generik Pack (Sildenafil Citrate 100mg, Tadalafil 20mg, Levitra 20mg)

Sildenafil Citrate

Warum sollte man fuer eine Erektion Sildenafil Citrate kaufen anstatt andere Medikamente fuer Erektile Dysfunktion?

Sildenafil ist ein Arzneistoff aus der Gruppe der PDE-5-Hemmer, welche eine gefaesserweiternde Substanz enthaelt. Grosse Bekanntheit erlangter Wirkstoff unter dem Namen Viagra und wird fuer die Behandlung der erektilen Dysfunktion benutzt, dass heisst bei Erektionsstoerungen beim Mann. Eine erektile Dysfunktion ist eine Sexualstoerung, bei der es einem Mann ueber einen laengeren Zeitraum hinweg nicht gelingt eine Erektion zu haben oder eine ausreichende Erektion des Penis zu erzielen oder beizubehalten. Erektile Dysfunktionen machen ein zufriedenes Sexualleben unmoeglich und Sildenafil kann dem entgegenwirken. Erektionsstoerungen ist eine Erkrankung die meistens in der zweiten Lebenshaelfte eines Mannes auftritt. Tests ergeben dass Maenner im Alter von 40 - 70 unter erektilen Dysfunktionen leiden. Viele Maenner kaufen alle Arten von Potenzmittel natuerlicher Art oder irgendein ein chemisches Produkt dass nicht geprueft wurde und die Dunkelziffer ist gross.

Kaufen Sie Sildenafil online dass ist praktisch und schnell ohne jegliche Versandkosten.

Gegenueber anderen Potenzmittel fuer erektile Dysfunktionen tritt der Effekt bei Sildenafil in zirka 20 Minuten nachdem Einnehmen ein und wirkt bis zu 5 Stunden. Auch ist es moeglich die Sildenafil Tablette zu teilen sodass Sie auch beim kaufen Geld einsparen koennen.

Sildenafil ist dass Potenzmittel fuer erektile Dysfunktion dass es am laengsten auf dem Markt zu kaufen gibt. Sildenafil ist der Pionier unter den Potenzmittel und das meist verkaufte Potenzmittel fuer erektile Dysfunktion und auch das bekannteste und am besten erforschte Medikament. Sildenafil ist das meist verkaufte Potenzmittel auf der ganzen Welt. Auch Sie werden den Kauf von Sildenafil nicht bereuen.

Sildenafil steht an erster Stelle fuer erektile Dysfunktionen. Maenner die sich richtig beraten haben wissen dass Sildenafil besser wirkt als alle anderen Potenzmittel die es auf dem Markt zu kaufen gibt.

Maenner berichten die Sildenafil kaufen dass die Wirkung nicht mit anderen Mittel fuer erektile Dysfunktion zu vergleichen sind. Machen Sie den ersten Schritt und kaufen Sie Sildenafil diskret im Internet und Sie werden sehen dass auch Sie ein erfuehltes Sexualleben haben koennen. Kaufen Sie Sildenafil, es lohnt sich.

Wie wirkt der Inhaltsstoff von Sildenafil Citrate?

Kaufen sie Sildenafil zur Behandlung von Impotenz (erektile Dysfunktion). Die Ursachen von Impotenz sind vielfaeltig. Bei Maennern ab 50 Jahren sind es meistens andere Erkrankungen, wie Arteriosklerose oder Bluthochdruck. Dann ist die Impotenz ein wichtiges Fruehwarzeichen fuer diese Erkrankungen. Sie sollten auf jeden Fall behandelt werden. In etwa 20 Prozent der Faelle ist die Impotenz psychisch bedingt, besonders in der Altersgruppe bis 35 Jahre. Die Erektion des Penis beruht auf einem raschen Bluteinstrom in den Schwellkoerper. Dazu muessen sich die Arterien erweitern. Dies ist nur moeglich, wenn die umliegende Muskulatur erschlafft. Bei sexueller Stimulation wird daher der Botenstoff Stickstoffmonoxid (NO) freigesetzt. Er aktiviert einen zweiten Botenstoff, das cGMP. Erst das cGMP laesst die Muskelzellen im Schwellkoerper erschlaffen und ermoeglicht damit den Bluteinstrom und die Erektion. Um die Erektion zu beenden wird cGMP ueber das Enzym Phosphodiesterase 5 (PDE-5) wieder abgebaut. Sildenafil ist ein PDE-5-Hemmer. Es

blockiert das Enzym Phosphodiesterase 5. Dadurch bleibt mehr cGMP im Umlauf, die Muskelentspannung verstärkt sich und die Erektion wird verbessert. Auf Grund dieses Mechanismus wirkt Sildenafil Citrate nur bei sexuell erregten Männern. Sildenafil Citrate hat keine luststeigernde Wirkung und kann deshalb keine Erektion erzwingen. Männer die Sildenafil Citrate kaufen, nehmen eine Tablette ca. 1 Stunde vor dem gewünschten Geschlechtsverkehr ein. Die Wirkung von Sildenafil Citrate hält bis zu 5 Stunden an.

Anwendungsgebiete von Sildenafil Citrate

Impotenz

Warnhinweise fuer Sildenafil Citrate!

Sildenafil Citrate

Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch die Sehleistung und somit das Reaktionsvermögen im Straßenverkehr oder bei der Bedienung von Maschinen beeinflussen.

Sildenafil Citrate kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol.

Wann ist das Medikament Sildenafil nicht für Sie geeignet (Kontraindikation)?

Erblich bedingte Erkrankungen der Netzhaut (Retina) des Auges, bei der die Funktion und die Strukturen der Zellen zu Grunde gehen Gleichzeitige Behandlung mit weiteren potenzfördernden Medikamenten Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren Niedriger Blutdruck (Hypotonie) Patienten, die zu Dauererektionen (Priapismus) neigen oder deren Penis anatomisch deformiert ist sollten das Medikament nur mit Vorsicht anwenden. Eine Dauererektion muss sofort ärztlich behandelt werden, sonst können Gewebsschäden und Potenzverlust die Folge sein. Schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen Schwere Leberfunktionsstörungen Vorsicht bei Magen-Darm-Geschwüren ist beim kaufen von Sildenafil Citrate Vorsicht geboten.

Schwangerschaft und Stillzeit

Der Kauf von Sildenafil Citrate ist fuer Maenner.

Nebenwirkungen von Sildenafil Citrate

Beachten Sie beim kaufen von Sildenafil Citrate auf die wichtigsten, bekannten Nebenwirkungen. Sie können auftreten, müssen aber nicht, da jeder Mensch unterschiedlich auf Medikamente anspricht.

Manchmal reagieren Menschen allergisch auf Medikamente. Sollten Sie Anzeichen einer allergischen Reaktion verspüren, informieren Sie sofort Ihren Arzt oder Apotheker.

Kopfschmerzen Hautrötung mit Hitzegefühl (Flush) Sehstörungen (Gelegentlich) Überreizbarkeit des Magens. Sie ist gekennzeichnet durch Völlegefühl, Magendruck und vorzeitigem Sättigungsgefühl, Sodbrennen, Oberbauchschmerzen, Übelkeit und selten auch Erbrechen.

(Gelegentlich) Verstopfung der Nase (Gelegentlich) Schmerzhaft, behandlungsbedürftige langandauernde Erektion (Priapismus) (Selten). Bei diesen Nebenwirkungen ist Vorsicht geboten beim kaufen dieses Medikamentes.

Wechselwirkungen

Die Wirkung von Medikamenten gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Nitrate oder NO-Donatoren beinhalten, kann stark ansteigen. Eine gleichzeitige Einnahme kann zu starkem Blutdruckabfall mit Kollaps führen. Daher bei Patienten mit diesen Herz-Kreislauf-Medikamenten ist

das kaufen von Sildenafil Citrate untersagt.

Dieser Text erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es werden nur klinisch bedeutende Informationen aufgeführt. Die Beschreibung ist neutral und basiert auf der vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) anerkannten FACHINFORMATION. Die Informationen stellen keine Empfehlung oder Bewerbung des Präparates dar. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker fuer die fachliche Beratung.

Tadalafil

Wie wirkt der Inhaltsstoff?

Kaufen Sie Tadalafil zur Behandlung von Impotenz (erektile Dysfunktion) eingesetzt.

Die Ursachen von Impotenz sind vielfältig. Bei Männern ab 50 Jahren sind es meistens andere Erkrankungen, wie Arteriosklerose oder Bluthochdruck. Dann ist die Impotenz ein wichtiges Frühwarnzeichen für diese Erkrankungen. Sie sollten auf jeden Fall behandelt werden. In etwa 20 Prozent der Fälle ist die Impotenz psychisch bedingt, besonders in der Altersgruppe bis 35 Jahre.

Die Erektion des Penis beruht auf einem raschen Bluteinstrom in den Schwellkörper. Dazu müssen sich die Arterien erweitern. Dies ist nur möglich, wenn die umliegende Muskulatur erschlafft.

Bei sexueller Stimulation wird daher der Botenstoff Stickstoffmonoxid (NO) freigesetzt. Er aktiviert einen zweiten Botenstoff, das cGMP. Erst das cGMP läßt die Muskelzellen im Schwellkörper erschlaffen und ermöglicht damit den Bluteinstrom und die Erektion. Um die Erektion zu beenden wird cGMP über das Enzym Phosphodiesterase 5 (PDE-5) wieder abgebaut.

Tadalafil ist ein PDE-5-Hemmer. Es blockiert das Enzym Phosphodiesterase 5. Dadurch bleibt mehr cGMP im Umlauf, die Muskelentspannung verstärkt sich und die Erektion wird verbessert.

Auf Grund dieses Mechanismus wirkt Tadalafil nur bei sexuell erregten Männern. Es hat keine luststeigernde Wirkung und kann deshalb keine Erektion erzwingen.

Tadalafil wird aufgrund seiner langen Wirkungszeit von bis zu 24 Stunden auch als "Wochenendpille" bezeichnet. Damit eignet sie sich für Männer, die innerhalb von zwei Tagen mehrmals Geschlechtsverkehr haben möchten. Empfohlen wird eine Tablette 30 Minuten bis 12 Stunden vorher einzunehmen.

Anwendungsgebiete von Tadalafil

Kaufen Sie Tadalafil bei Impotenz

Wann ist Tadalafil nicht für Sie geeignet (Kontraindikation)?

Vom Kauf von Tadalafil ist abzuraten wenn gleichzeitig Behandlungen mit weiteren potenzfördernden Medikamenten angewendet wird.

Tadalafil ist fuer Erwachsene.

Niedriger Blutdruck (Hypotonie)

Patienten, die zu Dauererektionen (Priapismus) neigen oder deren Penis anatomisch deformiert ist sollte Tadalafil nur mit Vorsicht gekauft werden. Eine Dauererektion muss sofort ärztlich behandelt werden, sonst können Gewebsschäden und Potenzverlust die Folge sein.

Auch bei bei schweren Leber-, Nieren- und Herzerkrankungen sollte Vorsicht mit dem Kauf vom Tadalafil angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Tadalafil ist fuer Maenner.

Nebenwirkungen von Tadalafil

Aufgelistet sind die wichtigsten, bekannten Nebenwirkungen. Sie können auftreten, müssen aber nicht, da jeder Mensch unterschiedlich auf Medikamente anspricht.

Manchmal reagieren Menschen allergisch auf Tadalafil. Vor dem Kauf, Sollten Sie Anzeichen einer allergischen Reaktion verspüren, informieren Sie sofort Ihren Arzt oder Apotheker.

Kopfschmerzen

Schwindel

Muskelschmerzen

Überreizbarkeit des Magens. Sie ist gekennzeichnet durch Völlegefühl, Magendruck und vorzeitigem Sättigungsgefühl, Sodbrennen, Oberbauchschmerzen, Übelkeit und selten auch Erbrechen.

Verstopfung der Nase

Hautrötung mit Hitzegefühl (Flush)

Rückenschmerzen

Augenentzündungen (Gelegentlich)

Wechselwirkungen

Die Wirkung von Medikamenten gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Nitrate oder NO-Donatoren beinhalten, kann stark ansteigen. Eine gleichzeitige Einnahme kann zu starkem Blutdruckabfall mit Kollaps führen. Tadalafil ist nicht geeignet fuer Patienten mit Herz-Kreislauf Medikamenten.

Bestimmte Medikamente gegen Infektionen mit Bakterien, Viren oder Pilzen, sowie die Einnahme mit Grapefruitsaft können die Nebenwirkungen von Tadalafil erhöhen.

Dieser Text erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es werden nur klinisch bedeutende Informationen aufgeführt. Die Beschreibung ist neutral und basiert auf der vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) anerkannten FACHINFORMATION. Die Informationen stellen keine Empfehlung oder Bewerbung des Präparates dar. Sie ersetzen auch nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker.

Vardenafil 20mg

Warum sollte man Vardenafil gegenüber anderen Medikamenten fuer Erektile Dysfunktion waehlen?

Vardenafil wird von Maennern gekauft die an einer erektilen Dysfunktion oder in anderen Worten an Impotenz leiden, aber auch gesundheitliche Probleme haben, wie etwa Diabetes, hohes Cholesterin oder Bluthochdruck. Vardenafil ist ein Arzneistoff aus der Gruppe der PDE-5-Hemmer, welche eine gefaesserweiternde Substanz enthaelt, und wird fuer die Behandlung der erektilen Dysfunktion benutzt, dass heisst bei Erektionsstörungen. Eine erektile Dysfunktion ist eine Sexualstörung, bei der es einem Mann über einen längeren Zeitraum hinweg unmoeglich ist eine Erektion zu haben oder eine ausreichende Errektion zu erzielen oder beizubehalten. Erektyle Dysfunktionen machen ein zufriedenes Sexualleben unmoeglich und Vardenafil kann dem entgegenwirken.

Erektionsstörungen treten meistens in der zweiten Lebenshälfte eines Mannes auf. Jedoch auch schon Maenner von 40 Jahren kaufen Vardenafil, besonders wenn Sie Probleme mit Diabetis oder Cholesterin haben. Leider nehmen sich die Maenner nicht die Zeit sich richtig zu informieren

welches Medikament am Besten zu Ihnen passt und kaufen alle Arten von Potenzmittel natuerlicher Art oder kaufen irgend ein chemisches Produkt dass nicht geprueft wurde und die Dunkelziffer ist gross. Informieren Sie sich bei uns bevor Sie ein Potenzmittel kaufen.

Vardenafil wird oral 30-60 Minuten vor dem Verkehr eingenommen, die meisten Maenner berichten, dass Sie eine Wirkung schon nach 30 Minuten spueren, sodass Sex spontaner stttfinden kann. Bei anderen Potenzmittel dauert es meistens laenger bis die Wirkung da ist. Wichtig ist dass Vardenafil sowie ander Potenzmittel fuer erektyle Dysfunktion nur helfen bei gleichzeitiger sexueller Stimulation. Vardenafil allein hat keine Lust steigernde Wirkung! Vardenafil wird in drei Dosierungen angeboten: 5, 10 und 20 mg. Es sind nur wenige Nebenwirkungen bekannt. Kaufen Sie Vardenafil bei uns online.

Vardenafil ist dass Potenzmittel fuer erektile Dysfunktion dass es schon sehr lange auf dem Markt zu kaufen gibt und gehoert zu den fuehrenden Potenzmittel fuer erektyle Dysfunktion und wurde lange erforscht und getestet. Sie werden vom Kauf nicht entaeuscht sein, im Gegenteil.

Kaufen Sie Vardenafil bei uns in der Online Apotheke. Der Kauf ist diskret und praktisch und ohne jegliche Versandkosten. Sie werden sehen dass auch Sie ein zufriedenes Sexualeben erleben koennen. Kaufen Sie Vardenafil, Sie werden es nicht bereuen

Wie wirkt der Inhaltsstoff?

Vardenafil wird zur Behandlung von Impotenz (erektiler Dysfunktion) eingesetzt.

Die Ursachen von Impotenz sind vielfältig. Bei Männern ab 50 Jahren sind es meistens andere Erkrankungen, wie Arteriosklerose oder Bluthochdruck. Dann ist die Impotenz ein wichtiges Frühwarnzeichen für diese Erkrankungen. Sie sollten auf jeden Fall behandelt werden. In etwa 20 Prozent der Fälle ist die Impotenz psychisch bedingt, besonders in der Altersgruppe bis 35 Jahre.

Die Erektion des Penis beruht auf einem raschen Bluteinstrom in den Schwellkörper. Dazu müssen sich die Arterien erweitern. Dies ist nur möglich, wenn die umliegende Muskulatur erschlafft.

Bei sexueller Stimulation wird daher der Botenstoff Stickstoffmonoxid (NO) freigesetzt. Er aktiviert einen zweiten Botenstoff, das cGMP. Erst das cGMP läßt die Muskelzellen im Schwellkörper erschlaffen und ermöglicht damit den Bluteinstrom und die Erektion. Um die Erektion zu beenden wird cGMP über das Enzym Phosphodiesterase 5 (PDE-5) wieder abgebaut.

Vardenafil ist ein PDE-5-Hemmer. Es blockiert das Enzym Phosphodiesterase 5. Dadurch bleibt mehr cGMP im Umlauf, die Muskelentspannung verstärkt sich und die Erektion wird verbessert.

Auf Grund dieses Mechanismus wirkt Vardenafil nur bei sexuell erregten Männern. Es hat keine luststeigernde Wirkung und kann deshalb keine Erektion erzwingen.

Die Wirkung von Vardenafil tritt schnell ein und hält bis zu 5 Stunden an. Damit ermöglicht Vardenafil auch spontanen Geschlechtsverkehr. Männer nehmen eine Tablette am besten 25 bis 60 Minuten vorher ein.

Anwendungsgebiete

Impotenz

Warnhinweise!

Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch die Sehleistung und somit das Reaktionsvermögen im Straßenverkehr oder bei der Bedienung von Maschinen beeinflussen.

Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol.

Wann ist das Medikament nicht für Sie geeignet (Kontraindikation)?

Erblich bedingte Erkrankungen der Netzhaut (Retina) des Auges, bei der die Funktion und die Strukturen der Zellen zu Grunde gehen

Gleichzeitige Behandlung mit weiteren potenzfördernden Medikamenten

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren

Niedriger Blutdruck (Hypotonie)

Patienten, die zu Dauererektionen (Priapismus) neigen oder deren Penis anatomisch deformiert ist sollten das Medikament nur mit Vorsicht anwenden. Eine Dauererektion muss sofort ärztlich behandelt werden, sonst können Gewebsschäden und Potenzverlust die Folge sein.

Vorsicht bei schweren Leber-, Nieren- und Herzerkrankungen

Schwangerschaft und Stillzeit

Für Frauen nicht indiziert

Nebenwirkungen

Aufgelistet sind die wichtigsten, bekanntesten Nebenwirkungen. Sie können auftreten, müssen aber nicht, da jeder Mensch unterschiedlich auf Medikamente anspricht. Manchmal reagieren Menschen allergisch auf Medikamente. Sollten Sie Anzeichen einer allergischen Reaktion verspüren, informieren Sie sofort Ihren Arzt oder Apotheker.

Kopfschmerzen

Schwindel

Überreizbarkeit des Magens. Sie ist gekennzeichnet durch Völlegefühl, Magendruck und vorzeitigem Sättigungsgefühl, Sodbrennen, Oberbauchschmerzen, Übelkeit und selten auch Erbrechen.

Verstopfung der Nase

Hautrötung mit Hitzegefühl (Flush)

Sehstörungen (Gelegentlich)

Überempfindlichkeit der Haut gegen Sonnenlicht (Photosensibilität) (Gelegentlich)

Bluthochdruck (Gelegentlich)

Wechselwirkungen

Die Wirkung von Medikamenten gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Nitrats oder NO-Donatoren beinhalten, kann stark ansteigen. Eine gleichzeitige Einnahme kann zu starkem Blutdruckabfall mit Kollaps führen. Daher dürfen Patienten mit diesen Herz-Kreislauf-Medikamenten Vardenafil nicht anwenden.

Bestimmte Medikamente gegen Infektionen mit Bakterien, Viren oder Pilzen, sowie die Einnahme mit Grapefruitsaft können die Nebenwirkungen von Vardenafil erhöhen und sollte deshalb möglichst vermieden werden.

Die gleichzeitige Anwendung von Alpha-Blockern gegen Bluthochdruck oder eine gutartige Prostatavergrößerung kann den Blutdruck zu stark senken und sollte deshalb unterbleiben. Dieser Text erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es werden nur klinisch bedeutende Informationen aufgeführt. Die Beschreibung ist neutral und basiert auf der vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) anerkannten FACHINFORMATION. Die Informationen stellen keine Empfehlung oder Bewerbung des Präparates dar. Sie ersetzen auch nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker.

* Die Illustrationen dienen nur grafischen Zwecken.