

Sildenafil Citrate Soft Tabs 100mg

Anwendung von Sildenafil Citrate Soft Tabs

Das Sildenafil Soft Tabs wird 15 bis 20 Minuten vor der sexuellen Aktivität unter die Zunge geschoben. Es darf nur den Anweisungen entsprechend eingenommen werden, normalerweise nicht mehr als einmal täglich. Die Halbdosis ist die empfohlene Dosis für die meisten Männer. Wenn Sie Sildenafil Soft Tabs verschlucken, anstatt es unter der Zunge vergehen zu lassen, wirkt es ähnlich wie das Handelsnamenprodukt und dessen generische Versionen.

Wie wirkt der Inhaltsstoff?

Kaufen Sie Soft Tabs Sildenafil Citrate zur Behandlung von Impotenz (erektiler Dysfunktion) eingesetzt.

Die Ursachen von Impotenz sind vielfältig. Bei Männern ab 50 Jahren sind es meistens andere Erkrankungen, wie Arteriosklerose oder Bluthochdruck. Dann ist die Impotenz ein wichtiges Frühwarnzeichen für diese Erkrankungen. Sie sollten auf jeden Fall behandelt werden. In etwa 20 Prozent der Fälle ist die Impotenz psychisch bedingt, besonders in der Altersgruppe bis 35 Jahre.

Die Erektion des Penis beruht auf einem raschen Bluteinstrom in den Schwellkörper. Dazu müssen sich die Arterien erweitern. Dies ist nur möglich, wenn die umliegende Muskulatur erschlafft.

Bei sexueller Stimulation wird daher der Botenstoff Stickstoffmonoxid (NO) freigesetzt. Er aktiviert einen zweiten Botenstoff, das cGMP. Erst das cGMP läßt die Muskelzellen im Schwellkörper erschlaffen und ermöglicht damit den Bluteinstrom und die Erektion. Um die Erektion zu beenden, wird cGMP über das Enzym Phosphodiesterase 5 (PDE-5) wieder abgebaut.

Sildenafil ist ein PDE-5-Hemmer. Es blockiert das Enzym Phosphodiesterase 5. Dadurch bleibt mehr cGMP im Umlauf, die Muskelentspannung verstärkt sich und die Erektion wird verbessert.

Auf Grund dieses Mechanismus wirkt Sildenafil nur bei sexuell erregten Männern. Es hat keine luststeigernde Wirkung und kann deshalb keine Erektion erzwingen.

Männer nehmen eine Sildenafil Soft Tab ca. 1 Stunde vor dem gewünschten Geschlechtsverkehr ein. Die Wirkung von Sildenafil Soft Tabs Citrate hält bis zu 5 Stunden an.

Anwendungsgebiete von SILDENAFIL SOFT TABS CITRATE

Kaufen Sie Sildenafil Soft Tabs bei Impotenz

Warnhinweise fuer Sildenafil Soft Tabs!

Sildenafil Soft Tabs Citrate kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch die Sehleistung und somit das Reaktionsvermögen im Straßenverkehr oder bei der Bedienung von Maschinen beeinflussen.

Sildenafil Soft Tabs Citrate kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol.

Wann sind die Sildenafil Soft Tabs nicht für Sie geeignet (Kontraindikation)?

Bei erblich bedingte Erkrankungen der Netzhaut (Retina) des Auges, bei der die Funktion und die Strukturen der Zellen zu Grunde gehen

Sildenafil Soft Tabs fuer Erwachsene.

Niedriger Blutdruck (Hypotonie)

Patienten, die zu Dauererektionen (Priapismus) neigen oder deren Penis anatomisch deformiert ist sollten das Medikament nur mit Vorsicht anwenden. Eine Dauererektion muss sofort ärztlich behandelt werden, sonst können Gewebsschäden und Potenzverlust die Folge sein.

Schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Konsultieren Sie Ihren Arzt bei schweren Leberfunktionsstoerungen und Magen-Darm-Geschwueren.

Kaufen Sie keine Sildenafil Soft Tabs bei Magen-Darm-Geschwüren ohne den Arzt zu konsultieren.

Schwangerschaft und Stillzeit

Sildenafil Soft Tabs fuer Maenner.

Nebenwirkungen von Sildenafil Soft Tabs

Aufgelistet sind die wichtigsten, bekannten Nebenwirkungen von Sildenafil Soft Tabs Citrate. Sie können auftreten, müssen aber nicht, da jeder Mensch unterschiedlich auf Medikamente anspricht. Manchmal reagieren Menschen allergisch auf Medikamente. Sollten Sie Anzeichen einer allergischen Reaktion verspüren, informieren Sie sofort Ihren Arzt oder Apotheker.

Kopfschmerzen

Hautrötung mit Hitzegefühl (Flush)

Sehstörungen (Gelegentlich)

Überreizbarkeit des Magens. Sie ist gekennzeichnet durch Völlegefühl, Magendruck und vorzeitigem Sättigungsgefühl, Sodbrennen, Oberbauchschmerzen, Übelkeit und selten auch Erbrechen.

(Gelegentlich)

Verstopfte Nase (Gelegentlich)

Schmerzhafte, behandlungsbedürftige langandauernde Erektion (Priapismus) (Selten)

Wechselwirkungen

Die Wirkung von Medikamenten gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Nitrate oder NO-Donatoren beinhalten, kann stark ansteigen. Eine gleichzeitige Einnahme kann zu starkem Blutdruckabfall mit Kollaps führen. Sildenafil Soft Tabs fuer Patienten ohne Herz-Kreislauf-Medikamente.

Dieser Text erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es werden nur klinisch bedeutende Informationen aufgeführt. Die Beschreibung ist neutral und basiert auf der vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) anerkannten FACHINFORMATION. Die Informationen stellen keine Empfehlung oder Bewerbung des Präparates dar. Sie ersetzen auch nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker.

* Die Illustrationen dienen nur grafischen Zwecken.