

## **Tadalafil Soft Tabs 20mg**

### **Anwendung von Tadalafil Soft Tabs**

Tadalafil Soft Tabs werden 15 bis 20 Minuten vor der [sexuellen Aktivität](#) unter die Zunge geschoben. Es darf nur den Anweisungen entsprechend eingenommen werden, normalerweise nicht mehr als einmal täglich. Die Halbdosis ist die empfohlene Dosis für die meisten Männer. Wenn Sie Tadalafil Soft Tabs das Medikament verschlucken, anstatt es unter der Zunge vergehen zu lassen, wirkt es ähnlich wie das Handelsnamenprodukt und dessen generische Versionen.

### **Wie wirkt der Inhaltsstoff?**

Tadalafil Soft Tabs werden gekauft zur Behandlung von Impotenz (erektile Dysfunktion) eingesetzt.

Die Ursachen von Impotenz sind vielfältig. Bei Männern ab 50 Jahren sind es meistens andere Erkrankungen, wie Arteriosklerose oder Bluthochdruck. Dann ist die Impotenz ein wichtiges Frühwarnzeichen für diese Erkrankungen. Sie sollten auf jeden Fall behandelt werden. In etwa 20 Prozent der Fälle ist die Impotenz psychisch bedingt, besonders in der Altersgruppe bis 35 Jahre.

Die Erektion des Penis beruht auf einem raschen Bluteinstrom in den Schwellkörper. Dazu müssen sich die Arterien erweitern. Dies ist nur möglich, wenn die umliegende Muskulatur erschlafft.

Bei sexueller Stimulation wird daher der Botenstoff Stickstoffmonoxid (NO) freigesetzt. Er aktiviert einen zweiten Botenstoff, das cGMP. Erst das cGMP läßt die Muskelzellen im Schwellkörper erschlaffen und ermöglicht damit den Bluteinstrom und die Erektion. Um die Erektion zu beenden wird cGMP über das Enzym Phosphodiesterase 5 (PDE-5) wieder abgebaut.

Tadalafil ist ein PDE-5-Hemmer. Es blockiert das Enzym Phosphodiesterase 5. Dadurch bleibt mehr cGMP im Umlauf, die Muskelentspannung verstärkt sich und die Erektion wird verbessert.

Auf Grund dieses Mechanismus wirkt Tadalafil nur bei sexuell erregten Männern. Es hat keine luststeigernde Wirkung und kann deshalb keine Erektion erzwingen.

Tadalafil wird aufgrund seiner langen Wirkungszeit von bis zu 24 Stunden auch als "Wochenendpille" bezeichnet. Damit eignet sie sich für Männer, die innerhalb von zwei Tagen mehrmals Geschlechtsverkehr haben möchten. Empfohlen wird eine Tablette 30 Minuten bis 12 Stunden vorher einzunehmen.

### **Anwendungsgebiete von Tadalafil Soft Tabs**

Kaufen Sie Tadalafil Soft Tabs bei Impotenz

### **Wann sind Tadalafil Soft Tabs nicht für Sie geeignet ( Kontraindikationen) ?**

Bei gleichzeitiger Behandlung mit weiteren potenzfoerdernden Medikamenten .

Tadalfil Soft Tabs nur fuer Erwachsene.

Kaufen Sie keine Tadalafil Soft Tabs bei niedrigem Blutdruck (Hypotonie)

Patienten, die zu Dauererektionen (Priapismus) neigen oder deren Penis anatomisch deformiert ist sollten das Medikament beim Kauf nur mit Vorsicht anwenden. Eine Dauererektion muss sofort ärztlich behandelt werden, sonst können Gewebsschäden und Potenzverlust die Folge sein , auch da raten wir vom Kauf von Tadalafil Soft Tabs ab.

Vorsicht beim kaufen von Tadalafil Soft Tabs bei schweren Leber-, Nieren- und Herzerkrankungen

## **Schwangerschaft und Stillzeit**

Tadalafil Soft Tabs fuer Maenner.

## **Nebenwirkungen von Tadalafil Soft Tabs**

Aufgelistet sind die wichtigsten, bekannten Nebenwirkungen. Sie können auftreten, müssen aber nicht, da jeder Mensch unterschiedlich auf Tadalafil Soft Tabs anspricht.

Manchmal reagieren Menschen allergisch auf Tadalafil Soft Tabs. Sollten Sie Anzeichen einer allergischen Reaktion verspüren, informieren Sie sofort Ihren Arzt oder Apotheker.

Kopfschmerzen

Schwindel

Muskelschmerzen

Überreizbarkeit des Magens. Sie ist gekennzeichnet durch Völlegefühl, Magendruck und vorzeitigem Sättigungsgefühl, Sodbrennen, Oberbauchschmerzen, Übelkeit und selten auch Erbrechen.

Verstopfung der Nase

Hautrötung mit Hitzegefühl (Flush)

Rückenschmerzen

Augenentzündungen (Gelegentlich)

## **Wechselwirkungen**

Die Wirkung von Medikamenten gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Nitrate oder NO-Donatoren beinhalten, kann stark ansteigen. Eine gleichzeitige Einnahme kann zu starkem Blutdruckabfall mit Kollaps führen. Bei Maennern mit Herz-Kreislauf-Medikamenten .

Bestimmte Medikamente gegen Infektionen mit Bakterien, Viren oder Pilzen, sowie die Einnahme mit Grapefruitsaft können die Nebenwirkungen von Tadalafil erhöhen.

Dieser Text erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es werden nur klinisch bedeutende Informationen aufgeführt. Die Beschreibung ist neutral und basiert auf der vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) anerkannten FACHINFORMATION. Die Informationen stellen keine Empfehlung oder Bewerbung des Präparates dar. Sie ersetzen auch nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker.

\* Die Illustrationen dienen nur grafischen Zwecken.